

T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi^{1,2}

Aşılar	Doğumda	1. ayın sonu	2. ayın sonu	4. ayın sonu	6. ayın sonu	12. ay sonu	18. ayın sonu	24. ayın sonu	İlköğretim 1. sınıf	İlköğretim 8. sınıf
Hepatit B Aşısı	I	II			III					
Verem Aşısı			I							
DaBT-İPA-Hib Aşısı			I	II	III		R			
Pnömonokok Aşısı			I	II	III	R				
Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı						I			R	
DaBT-İPA									R	
Çocuk Felci Aşısı					I		II			
Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı										R
Suçiçeği Aşısı						I				
Hepatit A Aşısı							I	II		

DaBT-İPA-Hib: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı, Hemofilus Influenza Tip B Aşısı (Beşli Karma Aşı)
 DaBT-İPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)
 R: Rapel (Pekiştirme)

Genişletilmiş Aşı Takvimi

Aşılar	2. ayın sonu	4. ayın sonu	6. ayın sonu	9. ayın sonu	12. ay sonu	18. ayın sonu	24. ayın sonu	İlköğretim 1. sınıf	İlköğretim 8. sınıf
Rotavirüs Aşıları ^{3,4}	I	II							
Suçiçeği Aşısı ⁵				I	9 ay - 12 yaş arası çocuklarda 2 doz				
Konjüge Meningokok Aşıları ^{6,7}					I	12. aydan itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlerde tek doz			
				I	II	2-11 yaş arası tek doz			
dabT Aşısı ⁸	4 yaş ve üzeri kişilerde								
dabT-İPA ⁹	3 yaş ve üzeri kişilerde								
HPV (Human Papilloma Virüsü) Aşıları ²⁻⁴	9 yaş ve üzeri 0, 1 ve 6. aylarda								
	9-26 yaş arası 0, 2 ve 6. aylarda								
Grip Aşıları ^{*10,11}	6 aydan itibaren her yıl								

dabT: azaltılmış doz difteri, aselüler boğmaca, tetanoz aşısı
 dabT-İPA: azaltılmış doz difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio aşısı
 * 6 ay-3 yaş arası pediyatrik doz uygulanır.